

## ديكلاكوكس سائل / بريمكس



## لتنتهي من عد الوفيات



ديكلاكوكس مصمم ليتناسب مع حاجاتك الحقيقية في مكافحة انواع الكوكسيديا الاكثر مقاومة



## تحويل جهودك التي ارباح.. لا ضرورة لتجريب ادوية اخرى

«» باستخدامك ديكلاكوكس لن تضطر الى اعادة العلاج مرات ومرات

- تذكر عند ادارة ازمة الكوكسيديا في مزرعتك :
- التنبه لمصادر البلل للفرشة و اصلاح الاعطال بسرعة.
- المحافظة على الفرشة جافة و نظيفها بشعل مستمر.
- ازالة المناطق المبتلة و استبدال باخرى جافة.
- استشارة طبيب البيطري لوضع خطة علاجية.
- القيام باستخدام العلاج ذو الفعالية الافوى عند بداية المرض.

الوصف	القيمة
الامعاء الطبيعية ولا اثر لآفة موضعية	0
الامعاء الطبيعية حشة و رقيقة و سهلة التوزيع	1
Focal necrosis and Air ulceration موت في جدار الامعاء و/أو تقرحات	2
موت في جدار الامعاء على شكل بقع و مساحات	3
موت في جدار الامعاء على مستوى واسع (يرى عادة في الطيور النافقة من هذا المرض)	4

1- في هذه التجربة تم اصابة جرعة السائل للشلل 100% ايموريا امبروفيتا و 20% و 100% ماكسيما و 100% شيليا من البويضات الحوصلة لكل طير وتم اسطوعا عن طريق اثناء في اليوم 22 من التجربة.  
2- تم الفاعل التقييم جونسن و ريد (1970) لتقييم الاصابة السوية لمرض Necrotic Enteritis حسب الجدول التالي (بريسكوت واخرون، 1978).

### ديكلاكوكس سائل

سائل مضاد للكوكسيديا للإضافة لماء الشرب

**التركيب**  
كل 1 مل يحتوي على: دايكلازويل 100 ملغم  
**الخصائص والاستعمالات**  
يوسف ديكلاكوكس سائل للكوكسيديا في الدجاج والطيور الاخرى و الناتجة عن ايموريا تيليللا، ا. نيكاتريكس، ا. اسروفولانس، ا. بروتس، ا. ميتس (ميدان)، و. ا. مكسيما، اضافة الى ذلك يقلل ديكلاكوكس سائل من الاضرار الناتجة عن الاصابة بمرض الكوكسيديا، و يحسن الحالة الصحية للحيوانات المصابة.  
**الجرعات وطريقة الاستعمال**  
الدجاج:  
اضف 500 مل ديكلاكوكس سائل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 8 ساعات، في حالات الاصابة الشديدة - اضف 1000 مل ديكلاكوكس سائل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 8 ساعات.  
**فترة المصحب**  
يجب عدم ذبح الطيور لأغراض الاستهلاك البشري خلال 5 أيام من آخر معالجة.  
**الحفظ والتخزين**  
يحفظ العلاج في مكان مظلم، تحت درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية.  
**الموت**  
1000 مل عبوة زجاجية وبلاستيكية، 500 مل و 1 لتر عبوات بلاستيكية

### ديكلاكوكس بريمكس

مضاد غليظ مضاد للكوكسيديا

**التركيب**  
كل 1 غم يحتوي على: دايكلازويل 2 ملغم  
**الخصائص والاستعمالات**  
يوسف ديكلاكوكس بريمكس الوقاية من الكوكسيديا في الدجاج والطيور الاخرى و الناتجة من ايموريا شيليللا، ا. نيكاتريكس، ا. اسروفولانس، ا. بروتس، ا. ميتس (ميدان)، و. ا. مكسيما، اضافة الى ذلك يقلل ديكلاكوكس سائل من الاضرار الناتجة عن الاصابة بمرض الكوكسيديا، و يحسن الحالة الصحية للحيوانات المصابة. كما يوسف الوقاية من الكوكسيديا في الديك الرومي والأرانب.  
**الجرعات وطريقة الاستعمال**  
يجب خلط ديكلاكوكس بريمكس جيداً في العلف قبل استخدامه.  
اخلط 500 غم من ديكلاكوكس بريمكس لكل طن من العلف الكامل حتى تحصل على تركيز 1 جزء لكل مليون جزء. يخلع بمزج ديكلاكوكس بريمكس أولاً في مركز أو بريمكس تأتي يحتوي على جزء واحد من ديكلاكوكس بريمكس وشمة أجزاء أو أكثر من مكونات العلف المناسبة وذلك قبل وضعه في الخلطة النهائية لضمان الانتشار.  
**فترة المصحب**  
يجب عدم ذبح الطيور لأغراض الاستهلاك البشري خلال 5 أيام من آخر معالجة.  
**الحفظ والتخزين**  
يحفظ العلاج في مكان مظلم، تحت درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية.  
**الموت**  
أكراس المانوم 500 غم و 1 كغم

## لتنتهي من عد الوفيات



Tel: 962 6 5727176 Fax: 962 6 5727668  
P.O. Box: 150906 Amman, 11115 Jordan  
E-mail: administration@avico.com.jo

