

## يرفع سقف توقعاتك

"بالمحصلة، ان استخدام 1 جزء من المليون من الديكلازوريل خلال دورة علاجات الكوكسيديا قد اظهر أداءً محسناً وفعالية اكبر ضد جرعة متنوعة من انواع ايميريا (المسببة للكوكسيديا) مكونة من ايميريا اسيرفولينا، ا. ماكسيما و ا. تينيللا وذلك بالمقارنة مع: نيكاربازين، ناراسين+نيكاربازين وزاولين في الطيور الصغيرة و مقابل السالينومييسين والمونينسين و لاسالوسيد في غذاء الدجاج اللاحم"

مقتبس من مجلة Poultry Science عام 2001 مجلد 80 الصفحة 420  
Efficacy of Diclazuril in Comparison with Chemical and Ionophorous Anticoccidials Against Eimeria spp. in Broiler Chickens in Floor Pens, D. P. Conway et al.

## ديكلاكوكس ... مبتكر من حاجات الحقل

### فعالية حقلية غير مسبوقه

سيمر زمن طويل و الكوكسيديا عاجزة امام ديكلاكوكس، ديكلاكوكس متفوق على ادوية الكوكسيديا الاخرى.

### تأثير شامل لكل مسببات الكوكسيديا المتنوعة

يؤثر ديكلاكوكس على جميع انواع الايميريا المسببة لكل اشكال الكوكسيديا.



### توافقية عالية

ديكلاكوكس يتعرف على مشكلتك و يحتويها بأقل قدر من الجهد والتكاليف، بشكله البريمكس و السائل، صمما للوقاية والعلاج.



### سريع التأثير بتركيبة قليلة

بالمقارنة مع مستحضرات اخرى فإن جرعة ديكلاكوكس هي الاقل

المستحضر	الجرعة جزء لكل مليون
ديكلازوريل (DICLAZURIL)	1 بريمكس، 2.5 سائل
سالينومييسين (salinomycin)	66
الاسالوسيد (lasalocid)	100
مونينسين (Monensin)	100
نيكاربازين (Nicarbazin)	80-100
هالوفوجينون (Halofuginone)	2-3
روبيندين (robenidine)	30-36

### آمان عالي

لم تظهر اية اعراض عند اعطاء 02 جزء من المليون (عشرة اضعاف الجرعة) لمدة 24 يوماً.

## كسر حلقة الكوكسيديا العنيدة ...

ديكلاكوكس ، سريع في تدمير و إيقاف تأثير الكوكسيديا المدمر على الدجاج، آمن عند الاستعمال، ذو جرعة فعالة منخفضة و يمتلك خواص وقائية و علاجية فريدة لجميع انواع الكوكسيديا




اعور مصاب



تدمير الكوكسيديا صحة الطير وتؤدي إلى الوفيات


## تحرك بارياحك نحو الأعلى ...



تظهر التجارب الحقلية ان تطبيق ديكلاكوكس يتعكس على معامل التحويل الغذائي بشكل ملموس مما يساعد على زيادة وزن الدجاج ، وعند مقارنة ديكلاكوكس مع غيره من المستحضرات التقليدية يظهر الفرق، ولا شك ان قراءات ميزان مزرعتك سترتفع!

\* كلما زادت فعالية العلاج يقل معامل التحويل الغذائي

## الثقة بالسجاج ...



ديكلاكوكس ينهي عهد الكوكسيديا المستعصية  
لن تكون الوفيات بسبب الكوكسيديا بعد اليوم

## كيف تؤدي الكوكسيديا الدجاج؟

تؤثر عدة عوامل على شدة العدوى بالكوكسيديا ومنها:

- الجرعة المعدية من الكوكسيديا التي تؤخذ من قبل الدجاجة.
- صرّة او نوع الكوكسيديا التي تصيبها ويتراوح الضرر باختلاف الصرّة.
- عوامل بيئية تؤثر على امكانية بقاء بيوض الكوكسيديا في فرشة الدجاج.
- عمر الطائر، حيث أن الطيور الصغيرة أكثر عرضة للاصابة من الكبيرة.
- الوضع الغذائي للطائر وتكون الطيور سيئة التغذية أكثر عرضة للاصابة.

ويتصبح العدوى واضحة بعد ثلاثة ايام من الاصابة. يتوقف الدجاج عن الأكل، و يهزل، يتجمع مع بعضه البعض، ومع اليوم الرابع يظهر الدم في البراز، و اكبر كمية من الدم تظهر مع اليوم الرابع الى السادس، وتحدث الوفيات بشكل غير متوقع، من جراء التلوث المتعدد و خصوصا في حالات الكوكسيديا الاعوربة المنتسبة عن ايميريا تينيللا، ويفترض ان تستمر الجائحة المرضية حتى اليوم الثامن او العاشر.

